



Dyrepasserlev Allan T. Gregersen og dyrepasser Lene Gilberg hjælper dyrlægen med at undersøge den bedøvede tapir.

tapiren derfor bedøvet. Tarmkanalen blev tømt for gødning ved at skylle med vand, således at kikkertundersøgelsen kunne gennemføres.

I forbindelse med denne undersøgelse blev der udtaget små stykker tarmslimhinde (biopsier), som senere blev undersøgt på et laboratorium ved mikroskopi.

Ved kikkertundersøgelsen virkede tarmens slimhinde rød og irriteret.

Ved mikroskopi fandt laboratoriet ud af at tapiren lider af colitis eller på dansk tyktarmskatarr.

Dette kan udløses af stress, eller hvis den har en sart mave.

Tapiren er nu i behandling for tyktarmskatarr og vi håber den er rask efter endt behandling. ■

Tapiren har ondt i maven

Kikkertundersøgelse gav ikke svaret, men en laboratorieundersøgelse tyder på, at den lider af tyktarmskatarr

Af dyrlæge Steffen Knold, Aarslev Dyreklinik

I februar i fjor fik Zoo en ny tapir på tre år efter at de gamle blev aflivet som følge af tuberkulose.

Den kommer fra Magdeburg i Tyskland. Tapiren har lige siden ankomsten virket en smule nervøs over for nye ting som for eksempel det nye anlæg. Tapiren er ved at have tillid til dyrepasserne og falder derved mere og mere til i Odense Zoo.

Tapiren har dog haft mave-/tarmproblemer i perioder, hvor den i én til to uger har tynd afføring. Vi har fået gødningen undersøgt for bakterier og parasitter, men uden fund som kunne forårsage diarren.

I perioder fik tapiren diætkost samt øget fiber-tilskud, men heller ikke dette hjalp. I enkelte uger havde tapiren normal fast gødning uden behandling.

Det blev derfor besluttet at tapiren skulle gennemgå en kikkertundersøgelse af tarmkanalen for om muligt at få en diagnose.

Midt i januar blev

Dyrlæge Steffen Knold i færd med en kikkertundersøgelse af tapirens tarm – han tog også prøver af tarmslimhindens, og hér fandt laboratoriet muligvis svaret.



Foto: Barne Klausen